

宇津こども鼻炎シロップA

宇津こども鼻炎シロップAはお子さまの鼻かぜなどの急性鼻炎、ハウスダスト・花粉などによるアレルギー性鼻炎などの諸症状の緩和にすぐれた効果を発揮する、のみやすいブドウ味の鼻炎シロップです。

《特長》

- ノンシュガー お砂糖を使わずに、おいしい「ブドウ味」のシロップにしました。
- ノンカフェイン カフェインを含んでいません。
- 容器 小さいお子さまが開けにくい安全キャップを使用したプラスチックボトルです。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鼻炎用内服薬に定められた注意事項として成人が服用される際のことも記載しております。

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難、むくみ

(7) 次の診断を受けた人。

緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状 |
|-------|---------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | 頭痛 |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 顔のほてり、異常なまぶしさ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|---------------------|---|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこぼりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】

本品60mL中

| 成分 | 分量 | 作用 |
|-------------------|--------|--------------------------------|
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 3mg | くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状をやわらげます。 |
| dI-メチルエフェドリン塩酸塩 | 50mg | 鼻粘膜の充血、はれをおさえて、鼻づまりをやわらげます。 |
| ベラドンナ総アルカロイド | 0.15mg | 鼻水、なみだ目をやわらげます。 |
| グリチルリチン酸二カリウム | 33mg | のどや鼻の炎症をやわらげます。 |

添加物として、還元麦芽糖水アメ、プロピレングリコール、パラベン、クエン酸 Na 水和物、クエン酸水和物、アセスルファム K、香料、エタノールを含有します。

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：

くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭痛

【用法・用量】

| 年齢 | 1回服用量 | 1日服用回数 |
|------------|-------|--|
| 7才以上11才未満 | 10mL | 1日3回食後、および、必要な場合には就寝前に服用してください。場合により1日6回まで服用しても差し支えありませんが、その場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。 |
| 3才以上7才未満 | 6.5mL | |
| 1才以上3才未満 | 5mL | |
| 6ヵ月以上1才未満 | 4mL | |
| 3ヵ月以上6ヵ月未満 | 3.3mL | |
| 3ヵ月未満 | | 服用しないでください。 |


【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 2才未満の乳幼児には、医師の診察を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3) 用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 計量カップは使用のつど、よく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。また、使用のつどボトルの口の周囲をよく拭いてからキャップをしっかりと締めてください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) キャップが開けにくいときは、キャップの部分に50～60℃のお湯に2～3分つけると開けやすくなります。

【安全キャップの使用方法】



【包装】

120mL

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
問い合わせ先 宇津救命丸株式会社 お客様相談室

電話 028-675-0425 受付時間/平日9:00～17:00

発売元 宇津救命丸株式会社 〒329-1224 栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢3987
製造販売元 新生薬品工業株式会社 〒635-0103 奈良県高市郡高取町清水谷1269