

# 宇津こどもせきどめシロップA

宇津こどもせきどめシロップAはお子さまのせき・たんにすぐれた効果を発揮する、のみやすいイチゴ味のせきどめです。生薬のナンテンジツとキキョウのエキスも配合しました。小さなお子さまのせきは、長く続くと睡眠や食事などの妨げになり、体力の消耗にもつながりますので、早めのお手当てが大切です。

## 《特長》

- ノンシュガー お砂糖を使わずに、おいしい「イチゴ味」のシロップにしました。
- ノンコデイン コデインを含んでいません。
- ノンカフェイン カフェインを含んでいません。
- 容器 小さいお子さまが開けにくい安全キャップを使用したプラスチックボトルです。

## ⚠️ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬に定められた注意事項として成人が服用される際のことも記載しております。



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

#### 3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気

#### 4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】

本品60mL中

成分	分量	作用
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	30mg	せきの中枢に働いてせきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	37.5mg	気管支に働いてせきをしずめ、たんの排泄を助けます。
グアイフェネシン	100mg	気道粘膜に働いて、たんを出しやすくします。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3mg	抗ヒスタミン作用により炎症をおさえ、せきをしずめます。
ナンテンジツエキス (原生薬換算量)	109mg (600mg)	せきをしずめる生薬成分です。
キキョウエキス (原生薬換算量)	40mg (400mg)	せきをしずめ、たんを出しやすくする生薬成分です。

添加物として、還元麦芽糖水アメ、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、パラベン、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、アセスルファミンK、香料、バニリン、エチルバニリン、プロピレングリコール、エタノールを含有します。

【成分・分量に関連する注意】

本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、効果には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

年齢	1回服用量	1日服用回数
8才以上11才未満	10mL	1日3回食後、および、必要な場合には就寝前に服用してください。場合により1日6回まで服用しても差し支えありませんが、その場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。
5才以上8才未満	6.5mL	
3才以上5才未満	5mL	
1才以上3才未満	4mL	
3ヵ月以上1才未満	2mL	
3ヵ月未満		服用しないでください。


【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3) 用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 計量カップは使用のつど、よく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。また、使用のつどボトルの口の周囲をよく拭いてからキャップをしっかりと締めてください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) キャップが開けにくいときは、キャップの部分に50～60℃のお湯に2～3分つけると開けやすくなります。

【安全キャップの使用法】



【包装】

120mL

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。  
問い合わせ先 宇津救命丸株式会社 お客様相談室

電話 028-675-0425 受付時間/平日9:00～17:00

発売元 宇津救命丸株式会社 〒329-1224 栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢3987  
製造販売元 新生薬品工業株式会社 〒635-0103 奈良県高市郡高取町清水谷1269